

後測

答案	編號	題	目
×	1	哺乳時，寶寶吸了5分鐘就停止不吸了，表示寶寶沒喝到足夠奶水。	
×	2	混合餵食的寶寶，都會乳頭混淆。	
×	3	產後24小時，寶寶仍不吸吮就要用奶瓶餵食。	
×	4	寶寶喝到足夠奶水都會笑咪咪。	
×	5	哺乳時，寶寶吸了5分鐘就停止不吸了，表示寶寶沒喝到足夠奶水。	
×	6	混合餵食的寶寶，都會乳頭混淆。	
×	7	產後24小時，寶寶仍不吸吮就要用奶瓶餵食。	
×	8	寶寶喝到足夠奶水都會笑咪咪。	
○	9	研究指出親子同室可以減少嬰兒瘁死症候群及感染的機率。	
×	10	親子同室就是母嬰同床。	
×	11	要看看寶寶是否肚子餓想吃奶，可以用手指摸嬰兒嘴角，若寶寶想舔就是飢餓。	
×	12	親子同室只有餵母乳媽媽可以選擇執行。	
×	13	個案告訴你擔心沒有奶水，你可以告訴她：放心，只有1%的人奶水不夠。	
×	14	研究顯示非親子同室的產婦睡得比較好。	
○	15	親子同室必須有良好的安犬感控措施做支持。	
○	16	乳房的大小主要是受脂肪組織影響，與泌乳量無直接關係。	
○	17	嬰兒要正確吸含，才能刺激到深層神經部分，啟動乳汁分泌。	
○	18	乳汁生成第一階段開始於懷孕階段。	
○	19	Sheehan's syndrome 是一種產後出血症候群，會導致產後無法製造乳汁。	
○	20	乳汁生成的第三階段屬於自主控制階段。	
×	21	催產素又稱為 Milk-making hormone。	
○	22	聆聽及了解技巧中理解性回應較能反應出，當媽媽還不是很清楚自己的問題或是想法時特別有用。	
○	23	建立母乳哺育信心時，不要讓母親覺得她做錯什麼事。	
○	24	提供支持技巧可使用一兩個建議而非命令。	
答案	編號	題	目
C	1	治療乳房膿腫抗生的素療程要多久？(A) 1週 (B) 2週 (C) 3-4週 (D)5-6週	
A	2	下列那種排出膿液方法，可以身心不留疤？(A) 空針抽出 (B) 引流 (C) 手術切開 (D) A, B, C 都可以	
C	3	下列何者不是寶寶飢餓暗示-尋乳動作(A)睜開且明亮、額頭上揚(B)嘴巴如吸吮的張開閉合(C)躁動哭泣 (D)將手放進嘴巴、手腳彎曲	
D	4	下列何者是產後機構的重要性(A)教導育嬰技巧(B)繼續醫院的母嬰親善措施(C)教導洗手時機注重安全與感控避免感染(D)以上皆是	
C	5	產後盡早哺餵母乳幫助惡露排出，是因為何種賀爾蒙？(A) Prostaglandin(B) Prolactin(C) Oxytocin(D) Adrenalin	
B	6	嬰兒在乳房上餵食時第一個接受到的刺激？(A) 腦下垂體前葉(B) 下視丘 (C) 腦下垂體後葉(D) 乳腺泡肌上皮細胞	
D	7	聆聽及了解技巧包含(A)使用有效的非語言溝通 (B)問開放性問題 (C)使用	

		表現出興趣的回應及姿態(D)以上皆是
C	8	同理母親的想法和感受當母親說：我的奶水稀稀的不夠好，所以我必須餵配方奶，妳認為哪個回應正確(A)喔~~不！ 奶水絕不會稀稀的不夠好，它就是這個樣子。(B)是的~~奶水稀稀的，可能是一個問題。(C)聽起來，你很擔心自己的奶水品質。
E	9	提供母乳支持技巧包含(A)同理母親的想法和感受(B)注意並讚美母親和嬰兒做的好的部份(C)給予實際的幫助(D)以正向的方式提供一些適切的資訊(E)以上皆是
D	10	諮詢的目的(A)了解母親的感受及嬰兒的需求(B)建立母親對哺乳及育兒的信心，可以開始並持續哺乳(C)提供完整的資訊，鼓勵母親選擇適合自己的方式(D)以上皆是。
C	11	聆聽及了解技巧中開放式問題為(A)『妳如何餵妳的寶寶？』(B)『你的寶寶吃什麼？』(C)以上皆是。